

agramin[®] K

Orale Rehydratationstränke mit effektiver Pufferwirkung

Für Tiere: Rinder (**Kälber**)

Inhaltsstoffe

Rohprotein	0 %	Natrium	25 %
Rohfett	0 %	Kalium	7 %
Rohfaser	0 %	Chlorid	13 %
Rohasche	33 %		

Bestandteile

Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Natriumacetat, Natriumpropionat, Natriumhydrogencarbonat, Dinatriumphosphat,

Zusatzstoffe:

Natriumcitrat, Saccharin-Natrium, Xanthan, Vanillin

Anwendungsgebiete

- Stabilisierung des Wasser- und Elektrolythaushaltes bei Verdauungsstörungen
- bei Dehydratation, Elektrolytverlusten
- zur Unterstützung tierärztlicher Therapiemaßnahmen z. B. Antibiotika-Behandlung
- Vorrangig für Kälber mit leichtem und mäßigem Durchfall, die noch freiwillig trinken

Achtung! Durchfall ist ein Symptom für eine Darmstörung, kann aber auch ein Hinweis auf eine ernsthafte Krankheit sein! In jedem Verdachtsfall für eine ernsthafte Erkrankung (Fieber, schlechter Allgemeinzustand, Erbrechen, Kolikschmerzen, etc.) muss unbedingt tierärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden!

Eigenschaften

- Diät-Ergänzungsfuttermittel
- optimale Zusammensetzung gemäß WHO-Empfehlungen
- Traubenzucker kann nach Bedarf zugesetzt werden
- leicht und vollständig löslich in Wasser, Milch oder MAT
- kann über Tränkeautomaten verabreicht werden

Fütterungshinweise

12,5 g agramin® K werden in 1 Liter lauwarmem Wasser, Milch oder MAT gelöst. Wenn es die Art der Verdauungsstörung zulässt, empfehlen wir zur Versorgung mit schnell verfügbarer Energie den Zusatz von **25 g** Traubenzucker pro Liter Tränke.

Der Messlöffel "Tierarzneimittel Nr. 2" fasst gestrichen gefüllt ca. 12,5 g.
Der Henkelbecher fasst gestrichen gefüllt ca. 150 g.

Bei 50 kg schweren Kälbern sollten täglich 4 bis 6 Liter Tränke in mehreren Portionen verabreicht werden. Wenn sich das Allgemeinbefinden des Kalbes deutlich bessert, sind 2 Liter pro Tag ausreichend. Es wird empfohlen, während der Behandlung die volle Milchtränke beizubehalten.

Die Tränke ist täglich frisch zuzubereiten.

Dauer der Anwendung

1 bis 7 Tage (1 bis 3 Tage bei Alleinfütterung)

Haltbarkeit

3 Jahre nach Herstellung

Lagerung

Vor Feuchtigkeit schützen.
Nach der Entnahme das Behältnis wieder fest verschließen.

Handelsformen

600 g Dose
3 kg Eimer
6 kg Eimer

freiverkäuflich

Diät-Ergänzungsfuttermittel

Stand der Information: 01/2008

**Berechnete Zusammensetzung der gem. Fütterungshinweisen
hergestellten Diättränke**

	mmol/l	WHO-Empfehlung mmol/l
Natrium	125	100 - 120
Kalium	20	20
Chlorid	49	50
Acetat + Propionat	53	50 - 80
Bicarbonat	13	
Citrat	5	2 - 10
Phosphat	7	5 - 15
Traubenzucker	126	110 - 140