

Humocarb[®], formuliert

Antidiarrhoikum, Diätetikum

Für Tiere: Kälber, Rinder, Schweine, Geflügel, Pferde, Schafe, Ziegen, Hunde, Katzen und kleine Heimtiere

Zusammensetzung

100 g Pulver enthalten als Wirkstoff:
Humocarb 99,4 g
sonstige Bestandteile:
Carboxymethylcellulose-Natrium

Anwendungsgebiete

- Metaphylaktisch und therapeutisch:
Gegen unspezifische Diarrhoe insbesondere auf nichtbakterieller, aber auch infektiöser Grundlage.
Gegen Dyspepsie (Gärungs- und Fäulnisdyspepsie) und Stoffwechselfysregulationen, die durch Umstellung, Futterwechsel, Fehlfütterung oder verminderte Futteraufnahme bedingt sind und in deren Folge Wachstumsstörungen auftreten.
- Prophylaktisch:
Zur Normalisierung der obligaten bakteriellen Magen-Darm-Flora und der davon abhängigen Regenerierung des Stoffwechsels.
Entgiftend gegen exogene und erst im Magen-Darm-Bereich gebildete toxische Verbindungen und deren Metabolite.

Eigenschaften und Wirkungsweise

Die enthaltenen Huminsäuren (55 % bezogen auf Trockenmasse) sind hochmolekulare Naturstoffe mit einer Magen-Darm-spezifischen Regulationswirkung. Ihre schleimhautabdeckenden und adstringierenden Eigenschaften vermindern die Einwirkung krankheitsverursachender Darminhaltsstoffe auf die geschädigten Darmschleimhäute. *Humocarb[®], formuliert* besitzt eine entzündungshemmende Wirkung auf die Schleimhäute des Darms. Durch die adsorptive Wirkung werden giftige Fremdstoffe, wie Eiweißtoxine, Futterschadstoffe, Pestizide und Schwermetalle gebunden und über den Verdauungstrakt ausgeschieden. Der durch Huminsäuren zusätzlich hervorgerufene ernährungsunterstützende Effekt, welcher ohne vermehrte Futterzufuhr zu einer verbesserten Körpermassezunahme führt, unterstützt wesentlich den Gesundungsprozess.

Gegenanzeigen

Keine bekannt

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Bei gleichzeitiger oraler Verabreichung anderer Arzneimittel wie z. B. Chemotherapeutika kann innerhalb von 2 Std. eine resorptionsmindernde Wirkung eintreten.

Dosierung und Dauer der Anwendung

Therapie	Tagesdosis	Behandlungsdauer
Therapie		
Kälber, Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Pferde:	300 bis 500 mg / kg KM	7 bis 15 Tage
Hunde, Katzen:	500 bis 1000 mg / kg KM	5 bis 10 Tage
kleine Heimtiere:	1000 bis 1500 mg / kg KM	5 bis 10 Tage
Geflügel:	1000 bis 1500 mg / kg KM	10 bis 20 Tage
Ziervögel:	1 g in 10 ml Wasser suspend. mehrmals täglich verabreichen	über 5 Tage
Prophylaxe		
Kälber, Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Pferde:	200 bis 300 mg / kg KM	10 bis 20 Tage
Hunde, Katzen:	250 bis 500 mg / kg KM	10 bis 20 Tage
kleine Heimtiere:	500 bis 750 mg / kg KM	10 bis 20 Tage
Bestandsbehandlung		
Therapie:	7,5 bis 10 kg / t Futter	über 7 bis 15 Tage
Prophylaxe:	3 bis 5 kg / t Futter	über 10 bis 20 Tage

Art der Anwendung

Humocarb[®], formuliert wird als Pulver oral verabreicht,

- durch Einmischen in das Futter
- als wässrige Aufschwemmung bzw. mit Milch oder Haferschleim vermischt (bei der Zubereitung feucht anteigen oder stark rühren).

1 gestrichener Teelöffel ca. 2 g, 1 gehäufte Teelöffel ca. 5 g,
1 gestrichener Esslöffel ca. 5 g, 1 gehäufte Esslöffel ca. 15 g

Das mit Humocarb[®], formuliert hergestellte Futter sollte sofort verfüttert werden.

Zum Vermischen mit folgenden Mischfutter-Typen entsprechend den Vorschriften der Futtermittelverordnung Anlage 2:

- | | |
|--|---|
| 1.1 Milchaustausch-FM für Aufzuchtkälber | 6.1 Allein-FM für Entenküken |
| 1.3 Ergänzungs-FM für Aufzuchtkälber | 6.2 Allein-FM für Mastmoschusentenküken |
| 1.4 Milchaustausch-FM I für Mastkälber | 6.3 Allein-FM für Mastenten |
| 1.5 Milchaustausch-FM II für Mastkälber | 6.4 Allein-FM I für Mastmoschusenten |
| 2.1 Milchaustausch-FM für Ferkel | 7.1 Allein-FM für Hühnerküken in der ersten Lebenswoche |
| 2.2 Ferkelaufzuchtfutter I | 7.2 Allein-FM für Hühnerküken |
| 2.3 Ferkelaufzuchtfutter II | 7.3 Allein-FM für Junghennen ab 7. Lebenswoche |
| 2.4 Allein-FM I für Mastschweine | 7.4 Allein-FM II für Junghennen ab 13. Lebenswoche |
| 2.5 Allein-FM II für Mastschweine | 7.5 Allein-FM I für Legehennen, energiearm |
| 2.6 Allein-FM für Mastschweine | 7.6 Allein-FM I für Legehennen |
| 2.7 Allein-FM für tragende Sauen | 7.7 Allein-FM II für Legehennen ab ca. 10. Lebensmonat |
| 2.8 Allein-FM für Sauen | 7.8 Allein-FM I für Broiler |
| 3.1 Milchaustausch-FM für Schaflämmer | 7.9 Allein-FM II für Broiler ab 5. Lebensw. |
| 3.2 Allein-FM für Mastschaflämmer | 8.1 Allein-FM für Truthühnerküken |
| 3.3 Ergänzungs-FM für Zuchtschafe | 8.2 Allein-FM für Masttruthühner |
| | 8.3 Allein-FM II für Masttruthühner ab 14. Lebenswoche |

Nebenwirkungen

Keine bekannt

Falls Sie eine Nebenwirkung bei Ihrem Tier feststellen, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

Wartezeit

Die Einhaltung einer Wartezeit ist nicht erforderlich.

Haltbarkeit

3 Jahre nach Herstellung

Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden.

Aufbewahrung

Vor Feuchtigkeit schützen.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Handelsformen

150 g Dose
1 kg Dose
3 kg Beutel

Hersteller und Inhaber der Zulassung

Pharmawerk Weinböhla GmbH, 01689 Weinböhla

apothekenpflichtig

Stand der Information: 01/2008