

## Produktinformation

# Sanosorb®

### Antidiarrhoikum

Für Tiere: Kälber und Ferkel

### Zusammensetzung

100 g Granulat enthalten:  
arzneilich wirksame Bestandteile:  
Medizinische Kohle 20 g  
Weißer Ton 30 g  
Gefälltes Siliciumdioxid 30 g  
sonstige Bestandteile:  
Sucrose (Saccharose), Carmellose-Natrium

### Anwendungsgebiete

Traditionell angewendet als mild wirkendes Arzneimittel zur unterstützenden Behandlung unspezifischer Durchfälle.

Die Wirkung von *Sanosorb*® bei Durchfallerkrankungen unterscheidet sich grundlegend von der der Chemotherapeutika und Antibiotika. Sie beruht auf der Oberflächenaktivität und Quellfähigkeit seiner untoxischen und nebenwirkungsfreien Bestandteile. Toxine und andere Schadstoffe werden adsorptiv gebunden. Quellvorgänge verzögern die Darmentleerung und führen in Verbindung mit Diätmaßnahmen zu einer raschen Normalisierung der Resorptionsvorgänge.

*Sanosorb*® ist ein traditionelles Arzneimittel, das ausschließlich aufgrund langjähriger Anwendung für das Anwendungsgebiet zugelassen ist. Bei fortdauernden Krankheitssymptomen sollte ein Tierarzt oder eine andere in einem Heilberuf tätige qualifizierte Person konsultiert werden.

### Eigenschaften

schwarzgraues Granulat, geruchlos

### Gegenanzeigen

Keine bekannt

### **Wechselwirkungen mit anderen Mitteln**

Mit einer teilweisen Adsorption von Futterinhaltsstoffen sowie gleichzeitig verabreichten Arzneimitteln ist zu rechnen.

### **Dosierung und Art der Anwendung**

Ferkel bis 3. Woche:	täglich 2,0 g / kg KM
Ferkel ab 4. Woche und Läufer:	täglich 1,0 g / kg KM
Kälber:	täglich 0,5 g / kg KM

Sanosorb® wird in einen Teil des Futters, der Tränke oder in Wasser eingemischt und vor der eigentlichen Fütterung verabreicht. Die Tagesdosis sollte möglichst auf zwei gleiche Gaben verteilt werden.

Der Messlöffel "Tierarzneimittel Nr. 1" fasst gestrichen gefüllt ca. 4 g.

Der Messlöffel "Tierarzneimittel Nr. 2" fasst gestrichen gefüllt ca. 14 g.

### **Dauer der Behandlung**

Falls nach 3tägiger Behandlungsdauer keine deutliche klinische Besserung eintritt, ist Sanosorb® abzusetzen und eine spezifisch erregerwirksame Therapie einzuleiten.

### **Nebenwirkungen**

Die nach Aufnahme des Präparates auftretende Grau- bzw. Schwarzfärbung des Kotes ist unbedenklich.

Falls Sie eine Nebenwirkung bei Ihrem Tier feststellen, die hier nicht aufgeführt ist, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

### **Wartezeit**

Die Einhaltung einer Wartezeit ist nicht erforderlich.

### **Haltbarkeit**

3 Jahre nach Herstellung

Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden.

### **Aufbewahrung**

Vor Feuchtigkeit schützen. Dicht verschlossen und nicht über 25 °C lagern. Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

### **Packungsgrößen**

200 g Dose

10 kg Beutel

freiverkäuflich

Als Tierarzneimittel zugelassen (Zul.-Nr.: 3100320.00.00)

Stand der Information: 01/2008