

Ventrasan[®] N

Antidiarrhoikum auf Basis von Eichenrinden-Pulver

Für Tiere: Rinder, Pferde, Schafe, Ziegen, Schweine, Hunde, Nerze, Kaninchen und Hühner

Zusammensetzung

100 g Pulver enthalten:
arzneilich wirksamen Bestandteil:
Eichenrindenpulver 97,7 g
sonstige Bestandteile:
Hochdisperses Siliciumdioxid, Saccharin-Natrium

Anwendungsgebiete

Traditionell angewendet als mild wirkendes Arzneimittel zur unterstützenden Behandlung nicht infektiöser Durchfälle und Magen-Darmerkrankungen.

Ventrasan[®] N ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel, das ausschließlich aufgrund langjähriger Anwendung für das Anwendungsgebiet zugelassen ist. Bei fortdauernden Krankheitssymptomen sollte ein Tierarzt oder eine andere in einem Heilberuf tätige qualifizierte Person konsultiert werden.

Eigenschaften

braunes bis rötlichbraunes Pulver
Ventrasan[®] N wirkt auf Grund seines Gehaltes an Gerbstoffen astringierend auf die Schleimhäute des Magen-Darmtrakts, wodurch Reizungen und Entzündungen zurückgehen. Darüber hinaus können Gerbstoffe mit Alkaloiden, Schwermetallen und Eiweißkörpern schwer lösliche und schwer resorbierbare Verbindungen bilden, woraus eine entgiftende Wirkung resultiert.

Gegenanzeigen

Keine bekannt

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Keine bekannt

Dosierung und Art der Anwendung

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Pferde, Rinder, Schweine: | täglich 0,1 g / kg KM |
| Fohlen, Kälber, Ferkel: | täglich 0,3 g / kg KM |
| Schafe, Ziegen: | täglich 0,2 g / kg KM |
| Hunde, Kaninchen, Nerze, Hühner: | täglich 0,3 g / kg KM |

Ventrasan® N wird vermischt mit wenig Futter oder verrührt mit Kamillentee bzw. Leinsamenschleim verabreicht. Die Tagesdosis wird auf drei gleiche Gaben verteilt. Der Messlöffel in der 40 g Dose fasst gestrichen gefüllt ca. 1,5 g, der Messlöffel "Tierarzneimittel Nr. 2" fasst gestrichen gefüllt ca. 7 g.

Dauer der Behandlung

1 bis 3 Tage

Nebenwirkungen

Keine bekannt

Falls Sie eine Nebenwirkung bei Ihrem Tier feststellen, teilen Sie diese dem Tierarzt oder Apotheker mit.

Wartezeit

Die Einhaltung einer Wartezeit ist nicht erforderlich.

Haltbarkeit

3 Jahre nach Herstellung

Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden.

Lagerung

Vor Licht schützen. Dicht verschlossen und nicht über 25 °C lagern.
Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Handelsformen

- 40 g Dose
- 400 g Dose
- 5 kg Beutel

apothekenpflichtig

Als Tierarzneimittel zugelassen (Zul.-Nr.: 3100385.00.00)

Stand der Information: 01/2008